

UWAGA !

W związku z pojawieniem się na terenie miasta (Park Zdrojowy i cmentarz) szkodnika **ćmy bukszpanowej** informujemy o konieczności i sposobie zwalczania tych owadów. Ćmę bukszpanową bardzo trudno jest zwalczyć, ponieważ jest gatunkiem inwazyjnym. Szybko się rozprzestrzenia - ze względu na możliwość swobodnego przemieszczania się na duże odległości.

Larwy ćmy bukszpanowej - zielone gąsienice z ciemnymi podłużnymi paskami - osiągają do 4 cm długości. Żerowanie larwa zaczyna od środka krzewu, dlatego najlepiej będzie zastosować środki o działaniu systemicznym, które wchłaniane są przez roślinę przez jej zielone części, a następnie zjadane przez owady.



ZWALCZANIE ĆMY BUKSZPANOWEJ

W sklepach, dostępne są biologiczne opryski przeciwko temu szkodnikowi, które można wykonywać w ogrodach, są to np: **Mospilan 20 SP**, **LEPINOX**, **XenTari WG**, **NeemAzaL- T/S**.

Opryski działają dopiero po zjedzeniu preparatu, wraz z liśćmi, przez owada. Dlatego najlepiej jest przed przystąpieniem do oprysku **WYBIERAĆ RĘCZNIE WSZYSTKIE GĄSIENICE** lub **OTRZEPYWAĆ JE Z KRZEWÓW PO UPRZEDNIM ROZŁOŻENIU FOLII**. Zebrane **GĄSIENICE** należy **ZNISZCZYĆ**, najlepiej spalić lub zakopać głęboko pod ziemią.

Warto zamontować pułapki świetlne lub feromonowe, które pomogą wyłapać dorosłe osobniki.

Dodatkowo **WARTO** nawozić zainfekowane rośliny, aby zwiększyć szanse bukszpanu na przetrwanie. Dobrze sprawdzi się również szczepionka mikoryzowa, która wspomaga pobieranie składników odżywczych i rozwój korzeni.

Uszkodzone przez larwy pędy warto opryskać przeciwko chorobom grzybiczym, ponieważ uszkodzone pędy są szczególnie podatne na wnikanie chorób.



Dorosły osobnik
ćmy bukszpanowej



Gąsienica ćmy żerująca na bukszpanie



Dorosły osobnik
ćmy bukszpanowej
odmiana brązowa

WSPÓLNIE CHROŹMY NASZE BUKSZPANY !